Salix hastata subsp. *picoeuropeana* (M. Laínz) T.E. Díaz, Fern. Prieto & Nava

SALICACEAE

DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción (NAVA FERNÁNDEZ & FERNÁNDEZ CASADO, 2004): Mata rastrera, de menos de 30 cm, con tallos subterráneos radicantes y tallos aéreos generalmente anuales. Hojas lanceoladas de borde finamente serrado y pecíolos de hasta 1,5 mm. Amentos femeninos de hasta 3 cm, con brácteas discolores cubiertas de pelos sedosos y más largas que el pedicelo. El ovario es glabro.

Distribución: Endemismo cantábrico citado originalmente en la Vega de Liordes (NAVA FERNÁNDEZ & FERNÁNDEZ CASADO, 2004), del que posteriormente se han dado otras citas en los Picos de Europa.

Hábitat: Tremedales minerotróficos neutro-basófilos de alta montaña (NAVA FERNÁNDEZ & FERNÁNDEZ CASADO, 2004).

Floración: Junio a julio (NAVA FERNÁNDEZ & FERNÁNDEZ CASADO, 2004).

BIOLOGÍA DE SEMILLAS

(NAVA FERNÁNDEZ & FERNÁNDEZ CASADO, 2004)

La reproducción es principalmente clonal, aunque se ha observado producción de semillas algunos años entre julio y agosto.

BIBLIOGRAFÍA

Babilonia (2013) Base de datos del Jardín Botánico Atlántico. Consultada Septiembre 2013. (http://www.aimjb.net/babilonia/).

Nava Fernández HS, Fernández Casado MA (2004) *Salix hastata* subsp. *picoeuropeana* (M. Laínz) T.E. Díaz, Fern. Prieto & Nava. En: *Atlas y libro rojo de la flora vascular amenazada de España.* (Eds. Bañares Á, Blanca G, Güemes J, Moreno JC, Ortiz S), p. 907. Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Madrid.